

## Grunur um brjóstabólgu

**Brjóstabólga án sýkingar:**

- Rautt svæði á brjósti
- Þrútið og aamt brjóst
- Hiti  $\leq 38,4^{\circ}\text{C}$  síðustu 24 klst.

**Brjóstabólga með sýkingu:**

- Rautt svæði á brjósti
- Flensulík einkenni
- Hiti  $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$  síðustu 24 klst.

**Brjóstabólga með ígerð (abscess):**

- Vel afmörkuð hörð, dúandi fyrirferð í brjóstinu
- Enn roði þrátt fyrir sýklalyf
- Staðfest ígerð með ómun á brjósti

### Meðferð við brjóstabólgu

Mikilvægast er að tæma mjólk oft og vel úr brjóstinu, leggja barn oft á brjóst, handmjólka eða nota mjaltavél

Er grunur um sýklasótt?

Nei

Já

### Sýklalyfjameðferð:

- T. Staklox 1 gr x 4. Íhuga að minnka skammt eftir 2-3 daga ef svörun er góð.
- Annað val er:
- T. Keflex 500 mg x 4 eða
- T. Dalacin 300 mg x 3

Ef ígerð er í brjósti er gerð ómskoðun og metin þörf á ástungu eða ísetningu drens

- Blóðræktun
- Sýklalyf í æð
- Fylgt verklagi um [sýklasótt](#)
- Innlögn

Hefur náðst bati á 48 klst. á þó meðferð?

Nei

Já

Endurmat á meðferð

Meðferð lokið